



Krämpfe bei Hypophysentumoren.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung

der Doktorwürde in der Medizin und Chirurgie

mit Genehmigung

der hohen medizinischen Fakultät der vereinigten

Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg

vorgelegt von

Kurt Sauerbrey aus Breslau.



Krämpfe bei Hypophysentumoren.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung

der Doktorwürde in der Medizin und Chirurgie

mit Genehmigung

der hohen medizinischen Fakultät der verei-
nigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg

vorgelegt von

Kurt Sauerbrey aus Breslau.



Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät der Universität Halle-Wittenberg.

Referent: Geheimer Medizinalrat Prof. Dr. Anton.

Krämpfe bei Hypophysentumoren.

Die Hypophyse gehört zu den endokrinen Drüsen, Drüsen mit innerer Sekretion, die im Körperhaushalte eine erhebliche Rolle spielen. Sie sind es, die infolge ihrer bisher noch nicht ganz einwandfrei geklärten mannigfachen Wechselbeziehungen das betreffende Individuum zu einer selbständigen, vollwertigen Persönlichkeit zu gestalten in der Lage sind. Fällt eine von ihnen in ihrer Funktionstüchtigkeit durch irgend welche Schädigung aus, so kommt es sehr bald zu Veränderungen des physischen und psychischen Verhaltens des Betroffenen. Diese Schädigung der innersekretorischen Fähigkeit kann durch die verschiedensten Ursachen zustande kommen. Was die Hypophyse anbetrifft, so ist diese Schädigung bedingt in den meisten Fällen durch eine Geschwulst der Hypophyse selbst, daneben kommt noch in Betracht die Kompression der Hypophyse von Seiten eines Tumors der Umgebung oder des erweiterten III. Ventrikals bei Hydrokephalus internus, durch ein Aneurysma, Gumma oder Hämatom der Umgebung.

Die pathologisch-anatomischen Befunde der Hypophysentumoren bieten ein mannigfaltiges Bild dar. Gemeinam ist ihnen allen aber die Eigentümlichkeit, daß sie die Drüse in ihrer sekretorischen Fähigkeit schädigen, indem sie diese zerstören, oder nur komprimieren, oder gar nur ihre Verbindung mit der Hirnbasis unterbrechen.

Unter den Hypophysentumoren befinden sich nach den Arbeiten von Benda am häufigsten Adenome, die normalen chromophoben und chromophilen Zellen der Hypophyse, aber auch veränderte Zellformen finden sich in den Adenomen in verschiedenen Anordnungen vertreten. Oft ist der normale Drüsenaufbau erhalten, oft ist nach Strada, Fischer u. a. eine mehr papilläre Struktur vorhanden. Wie alle Adenome können sie zystisch degenerieren oder blutig erweichen.

Nach Erdheim bezeichnet man eine zweite Gruppe von Hypophysentumoren als Hypophysenganggeschwülste. Sie gehen von dem Plattenepithel des Infundibulum oder vom Innern der Hypophyse aus und entwickeln sich auch daselbst. Es finden sich teils solide, teils zystische Bildungen benignen Charakters, die nur in die Nachbarschaft vordringen, oder sie erweisen sich, was selten ist, maligne und greifen auf die Umgebung über.

Neben diesen meist zystischen Charakter aufweisenden Adenomen und Hypophysenganggeschwülsten, die vom Plattenepithel ihren Ausgang nehmen, finden sich zystische Tumoren unbekannten Ursprungs, die nach Schüller aus der Neurohypophyse stammen. Ferner Sarkome, Gliome, Lipome und Fibrome. Erdheim, Ottenburg u. a. beschreiben zystische Bildungen innerhalb der Geschwülste, ebenso nicht selten darin vorkommende Verkalkungsherde. Metastasen der Hypophysentumoren sind so gut wie nie beobachtet worden, eine Eigentümlichkeit, die fast allen intrakraniellen Tumoren zukommt.

Infektiöse Geschwülste finden sich nur ganz vereinzelt, beschrieben wird in der Literatur als relativ häufiger vorkommend das Syphilom.

Die Tumoren der Hypophyse sind ziemlich regel-

mäßig geformt, ihre Größe jedoch sehr verschieden. Man hat über wallnuß-große Geschwülste beobachtet. Sie bedienen sich aber mehr oder weniger der Sella turcica, die sie nach allen Seiten hin erweitern, selbst mit Einbeziehung der Keilbeinhöhle. Die knöchernen Teile des Eingangs des Türkenfattels werden ausgedehnt usuriert, später kommt es zur Zerstörung des Sellabodens, der Tumor wächst in die Keilbeinhöhle vor. Die Erweiterung ist oft ganz asymmetrisch, je nach dem Aufbau der Geschwülste. Die noch vorhandenen Knochenwände bleiben glatt, da der Knochen durch Druck zur Usur gebracht wird und fast niemals durch Infiltration. Der über den Türkenfattel wachsende Teil des Tumor dringt in die umgebenden Hirnteile ein gegen Chiasma, III. Ventrikel bis zum pons, Hypokampus und Schläfenlappen, auch zum Stirnhirn und führt so zu Reizungs- und Lähmungserscheinungen der Hirnteile und Nerven, die der Geschwulst bei ihrem Wachstum in den Weg kommen, insbesondere Augenmuskelnerven, nervus olfaktorius, trigeminus.

Das Röntgenbild zeigte, wie man schon am Lebenden die Destruktionen am knöchernen Schädel feststellen kann. Man bemerkt dabei einen Unterschied in der Form des Knochen schattens der Sella zwischen intra- und extrasellar entstandenen Hypophysentumoren auf die Erdheim zuerst hingewiesen hat. Geschwülste intrasellaren Ursprungs bewirken eine gleichmäßige Erweiterung des Türkenfattels, sein Boden wird vertieft, verdünnt und scheint sich der mittleren Schädelgrube zu nähern.

Anders die extrasellar entstandenen Tumoren. Sie erweitern die Sella nach Usurierung des dorsum et tuberculum sellare flachschüsselförmig. Seltene sehr

große Geschwülste führen eine noch hochgradigere bis totale Zerstörung des Keilbeinkörpers herbei.

Wie eingangs erwähnt, schädigen die Tumoren die innersekretorische Fähigkeit der Hypophyse. Seit zwei Jahrzehnten hat man sich damit befaßt, die Bedeutung der Hypophyse, die sich aus einem vorderen drüsigen Anteile, einem nevrösen hinteren Anteile und einem intermediären Anteile zusammensetzt, auf das Individuum festzustellen. Heute weiß man, daß die Fettsucht bei der Distrophia adiposo-genitalis durch eine Hypofunktion der Hypophyse und zwar des Vorderlappens derselben zustande kommt. Die Betroffenen nehmen unförmig an Körpergewicht zu und machen einen pastösen Eindruck. Infolge ihrer Leibesfülle werden sie schwer beweglich, was zu noch vermehrtem Fettansatz führt. In auffälliger Weise sind genitale Störungen von Hypophysenerkrankungen abhängig. Das Sekret des Vorderlappens übt auf die Genese der Keimdrüsen einen fördernden Einfluß aus, kommt es aber durch irgend eine Störung in der Funktion der Hypophyse zu Hypo- oder Hyperpituitarismus, so tritt eine Entwicklungshemmung der Geschlechtsdrüsen ein mit mangelhafter, ja heterologer Ausbildung der sekundären Geschlechtscharaktere und vollständigem Funktionsausfall der Geschlechtsorgane ein. Schon bei Beginn von Hypophysenaffektion pflegen solche genitalen Störungen nicht zu fehlen. Die Frauen leiden an Amenorrhoe, ohne daß sie über die sonstigen dabei vorkommenden uterooveriellen Störungen zu klagen haben. Auch beim Manne fehlen die genitalen Störungen von Anfang an nicht und bestehen in der Hauptsache in Abnahme der libido und potentia coeundi meist verbunden mit Hypotrichosis und Annahme eines

ausgesprochenen weiblichen Habitus. Das Krankheitsbild der Hyperfunktion der Hypophyse wird gekennzeichnet durch den Symptomenkomplex der Akromegalie. Charakteristisch für dies Stadium sind die Mißbildungen, die im Wesentlichen in Knochenhypertrophien bestehen und sich auf Hände, Füße, Kopf und Brust beschränken. Die Joch- und Augenbraunenbogen treten stärker hervor. Nase, Ohren, Kinn hypertrophieren mitsamt ihren Weichteilen; die unteren Zähne treten auffällig vor den oberen hervor. Hände und Füße zeigen Verunstaltungen, sie sind eher verdickt und verbreitert als verlängert und erscheinen außerordentlich plump. Da auch hier die Weichteile hypertrophieren, so machen die Hände des Akromegalikers den Eindruck des „Gepolsterten“. Infolge einer cerviko-dorsalen Kyphose erscheint der Hals dick und kurz und zwischen den Schultern einzusinken. Sternum und Rippen sind stark verdickt und verbreitert, die Rippenwinkel springen vor.

Außer diesem partiellen Riesenwuchs kann es besonders in der Jugend zu allgemeinem Riesenwuchs, von dem Anton verschiedene Fälle beschrieben hat, andererseits aber Zurückbleiben des Längenwachstums Persistieren des kindlichen Habitus, zu sogenanntem Zwerchwuchs kommen.

Unter all diesen Veränderungen beobachtet man noch eine gewisse Anzahl unbeständiger Störungen. Glykofurie kommt nach P. Marie in $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ aller Fälle vor; sie kann jahrelang bis zu 1000 gr. Zucker täglich ausmachen, ohne sonstige Erscheinungen eines Diabetes mellitus. Nach Aschner handelt es sich um eine Adrenalin-Glykofurie. Außer Polyurie findet sich häufig eine Polydipsie verbunden mit einer recht beträchtlichen

Polyphagie. Götsch, Cushing, Jacobsen u. a. halten als Ausgangspunkt des hypophysären Diabetes den hinteren Lappen, speziell den intermediären Anteil der geschädigten Hypophyse. In der Literatur werden noch erwähnt vasomotorische Störungen, Dermagraphismus Anomalien der Schweißsekretion, meist Hyperhidrosis, Tachykardie, Untertemperatur und endokrine Blutveränderungen.

Zu diesen vegetativen Zeichen der Alteration der Hypophyse kommen als Lokalsymptom fast stets Sehstörungen hinzu, ja es sind meistens die ersten Beschwerden, über die geklagt wird, v. Frankl-Hochwart fand in 72 Fällen von Hypophysentumoren nur zweimal den Visus normal. Es handelt sich fast immer um eine bitemporale Hemianopsie, auf die zuerst Schulze aufmerksam gemacht hat, bei temporaler Abblässung der Papille, die isoliert sein kann, oder sich mehr oder weniger auf das nasale Gebiet erstreckt, die in der Stärke und Ausdehnung vielfachen Schwankungen während der Krankheit unterworfen ist, allmählich aber durch Sehnervenatrophie zu vollständiger Amaurosis führt. Diese bitemporale Hemianopsie ist charakteristisch für eine Chiasmaläsion im mittleren Teile und pathognomisch für Hypophysentumoren.

Von den viel und mannigfaltigen Hirnsymptomen, die ein Hypophysentumor bei seiner oft auffällig langen Dauer hervorrufen kann, ist von den Allgemeinercheinungen Kopfschmerz sehr früh vorhanden. Lokalisiert wird er meist basal, mitunter wird er auch in Stirn und Scheitel ausstrahlend angegeben. Insbesondere im Anfang der Erkrankung finden sich relativ häufig Kopfschmerzen, die lebhaft an Migränekopfschmerz erinnern, indem er anfallsweise auftritt und

neuralgieformen Charakter annimmt, häufig folgen Schwindel und Erbrechen. Nach Bruns soll der Kopfschmerz dauernd eine gewisse Intensität besitzen, von Zeit zu Zeit aber ganz excessiv werden z. B. zu gewissen Tageszeiten, unter dem Einfluß kongestiver Momente, beim Husten Pressen, ja schon Lagewechsel soll imstande sein, den Kopfschmerz unerträglich zu machen. Während dieser Kopfschmerzparoxysmen treten oft Schwindel, Erbrechen, nach Schüller oft vollständige Apathie, Benommenheit oder andererseits Verworrenheit mit hochgradigen Erregungszuständen auf. Derselbe Autor zusammen mit Fuchs, v. Frankl-Hochwart haben auf das regelmäßige Vorkommen psychischen Störungen bei Hypophysentumoren aufmerksam gemacht. Es finden sich danach Gedächtnisschwäche, oft an Korsakoff erinnernd, Euphorie oder delirante Zustände und Halluzinationen. Häufig beobachtet man eigentümliche Schlafzustände, die oft viele Wochen anhalten können. Nach Oppenheim und Bruns ist die Benommenheit und Schlafsucht die hauptsächlichste psychische Störung bei Hypophysentumoren. Allerdings erwähnen sie auch psychische Störungen, die echten Psychosen, wie Mania, Melancholie und deliranten Zuständen ähneln. Andererseits zeigen manche Kranke ein hypomanisches Wesen. Ihre Aufmerksamkeit und Gedankenablauf ist anfänglich nicht gestört, erst später werden sie, und das ist ein sehr häufiges Symptom, leicht ermüdbar und benommen. Daher führen die meisten Autoren Apathie, rasche Ermüdbarkeit, Schlafsucht und Benommenheit als psychische Hauptsymptome bei Hypophysentumoren an. Allerdings kann man Schüller nicht ganz Unrecht geben, wenn er diese psychischen Erscheinungen nicht der Lokalwirkung der Tu-

moren, sondern mehr der einfachen Hirndruckwirkung zugeschrieben wissen will, besonders da die Erscheinungen nach Balkenstich oder Subokzipitalstich, also den hirndruckentlastenden Methoden, fast regelmäßig zurückzugehen pflegen.

Recht verschieden ist das Bild und die Art der Krampfanfälle, die bei Hypophysentumoren zur Beobachtung kommen und auf die Redlich u. A. zuerst aufmerksam gemacht haben. Meistens handelt es sich um umschriebene epileptiforme Anfälle, die aber im weiteren Verlauf der Krankheit verallgemeinern können. Die Krampfanfälle können nun in jedem Stadium der Erkrankung auftreten, besonders oft auf der Höhe der Krankheit im Stadium der Hirndrucksteigerung, finden sich aber als Anfangssymptome gar nicht so selten. In der Literatur sind Fälle beschrieben, in denen die Epilepsie viele Jahre den anderen Symptomen des Hypophysentumors vorausging und daß sie zurückging, als diese deutlich in die Erscheinung traten. Oft deckte erst die Obduktion die Anwesenheit einer Geschwulst der Hypophyse auf, die im Leben als eine genuine Epilepsie imponiert hatte. Es wäre möglich, daß die noch nicht einwandfrei geklärten Hirnveränderungen bei Epilepsie der Bildung eines Tumor Vorstufung leisten können. Allerdings ist nicht zu vergessen, daß Epilepsie und Hypophysentumor vollständig unabhängig von einander bestehen können, denn es ist bei der weiten Verbreitung der Epilepsie selbstverständlich möglich, daß ein Epileptiker auch einmal an einem Tumor der Hypophyse erkranken kann, ohne daß sich die Erkrankungen gegenseitig bedingen.

Die Anfälle, die bei Geschwülsten der Hypophyse auftreten, unterscheiden sich von den typischen Fällen

der genuinen Epilepsie durch verschiedene Merkmale. Es finden sich sehr häufig Anfälle von Bewußtlosigkeit, meist von ganz kurzer Dauer ohne Zuckungen, sodaß sie dem Bilde des *Petit mal* gleichen. Kurzdauernde psychische Störungen oder auch nur die Form psychischer Äquivalente kommen dabei mit zur Beobachtung. Andererseits kann die Bewußtlosigkeit verbunden sein mit allgemeinen Konvulsionen von langer Dauer, die für Epilepsie nicht charakteristisch ist. Die allgemeinen Konvulsionen erinnern an genuine Epilepsie, da sie aber oft das erste und selbst längere Zeit hindurch das einzige Symptom des Hypophysentumors sein können, so sollte man stets in Fällen von Spätepilepsie, die im Verlaufe der Erkrankung progredienten Charakter zeigt, eine Hypophysengeschwulst in den Kreis der Untersuchung ziehen.

Ferner gibt es Anfälle, in denen sich die Konvulsionen bei nur getrübt, ja sogar erhaltenem Bewußtsein abspielen. Bei diesen Attaquen findet sich häufig der Typ der Jackson'schen Rindenepilepsie vertreten, in dem sich die Konvulsionen nur in einem oder beiden Armen, beiden Beinen, oder in allen 4 Extremitäten zeigen. In letzterem Falle tritt allerdings später noch Bewußtlosigkeit hinzu. Die Anfälle erinnern also sehr an Hysterie. Der Kranke kann seinen Krampfanfall selbst verfolgen, er sieht wie die Konvulsionen beginnen, wie sie weiter wandern, um das Bewußtsein zu verlieren, sobald das Gesicht ergriffen wird, oder der Kopf und Augen sich nach der befallenen Seite drehen. Bei den partiellen Krampfanfällen bleibt also meist das Bewußtsein wenigstens im Anfang ungetrübt, zum Unterschied von der idiopathischen Epilepsie. Mitunter verlaufen einige Anfälle bei demselben

Individuum bei freiem Sensorium, zu anderen gleichartigen tritt Bewußtlosigkeit hinzu, wie es der unten beschriebene Fall III zeigt.

Meist allerdings verzieht sich plötzlich der Mund nach einer Seite, Kopf und Augen werden nach links oder rechts gedreht, Hand und Finger, oder Fuß und Zehen zucken oder spannen sich tetanisch an. Es handelt sich also um tonische und klonische Krämpfe in bestimmten Muskelgebieten. Diese Anfälle dauern gewöhnlich nur einige Sekunden bis Minuten und wiederholen sich nach Stunden, Tagen oder Wochen und Monaten in stereotyper Weise. Krampfanfälle rein tonischer Art zeigt:

Fall I. B. Frieda, 23 Jahre alt.

Anamnese: Als Kind Rachitis, auf der Schule schwer vorwärts gekommen, später öfter Ohnmachtsanfälle. Seit einem Jahre Amenorrhoe und hochgradige Verschlechterung des Sehvermögens mit Kopfschmerzen im Hinterkopf.

stat. fom.: Motilität, Sensibilität und Reflexerregbarkeit o. B. Papillen im ganzen vollkommen verwaschen. Gefäße am Rande der Papille umgeknickt. Fingerzählen dicht vor den Augen. Sonstiger Körperbefund o. B.

Das Röntgenbild des Schädels zeigt einen Schatten der Sella turcica.

stat. psych.: Psychische Veränderungen lassen sich nicht nachweisen.

klin. Diagnose: Hypophysentumor. An der Patientin wurde der Balkenstich nach Anton und v. Bramann ausgeführt, worauf Besserung der Beschwerden eintrat. Nach zwei Monaten tritt täglich ein tonischer Krampfzustand auf. Patientin krümmt sich nach rechts oder

links zusammen, sodaß ganz verschrobene Haltungen zustande kommen. Das Bewußtsein ist getrübt, mitunter gibt sie gar keine Antworten. Läßt unter sich. Diese tonischen Krampfanfälle nahmen im Verlaufe des Aufenthaltes in der Klinik an Häufigkeit zu bis nach 4 Monaten der Exitus letalis erfolgte.

Kombiniert können die Krampfanfälle mit Gefühlsstörungen sein. So kommt u. a. vor, daß die tonischen und klonischen Krämpfe mit Parästhesien, mit Kälte, Frostgefühl und Schmerzen in den befallenen Körperteilen einhergehen. Da diese subjektiven Empfindungen nicht immer den Krampfanfällen parallel zu gehen pflegen, sondern ihnen vorausgehen oder nachfolgen, ja sogar auch allein den Anfall bilden können, so ließe sich nach Oppenheim diese Form der Anfälle als sensorische Form der partiellen epileptiformen Anfälle bezeichnen. Diese Form zeigen deutlich die beiden folgenden Fälle.

Fall II. B. Gerhard, 13 Jahr alt.

Anamnese: Heredität o. B. Eltern und Geschwister gesund. Seit seinem 8. Lebensjahre begann Patient auffällig dick zu werden. Vor einem halben Jahre fing die Schkraft an nachzulassen, außerdem bekommt er seit dieser Zeit öfter Anfälle von Kopfschmerzen, Frostgefühl und Zittern, die 10 Minuten anhalten. Nachher schläft Patient einige Stunden.

stat. som.: Sensibilität, Mobilität und Reflexerregbarkeit. o. B. Patient bietet das typische Bild der *dystrophia adiposo-genitalis* dar, hochgradige Einengung des Gesichtsfeldes.

stat. psych.: In psychischer Beziehung läßt sich nichts Krankhaftes nachweisen.

klin. Diag.: Hypophysentumor. Patient wurde nach Abschluß der Untersuchung entlassen.

Fall III. Sch. Kurt, 12 Jahre.

Anamnese: Heredität o. B. Eltern gesund. Seit seinem 11. Lebensjahre Klagen über Kopfschmerzen in der Stirngegend, die anfallsweise alle 1-2 Wochen, in letzter Zeit öfter auftreten. Starke Abnahme des Sehvermögens.

Stat som.: Motilität, Sensibilität und Reflexerregbarkeit o. B. beiderseits temporale Abblaffung der Papille Visus rechts 5/5., links Fingerzählen dicht vor dem Auge. Sonst körperlich o. B.

Das Röntgenbild des Schädels ergibt nur das Vorhandensein des hinteren proc. clinoides an der Sella turcica und vollkommenes Fehlen der übrigen Teile.

Stat. psych. Keine krankhaften Veränderungen nachweisbar.

klin. Diag. Hypophysentumor Während der klinischen Behandlung bekam er Anfälle. Schrie plötzlich laut auf, wälzte sich auf den Bauch, stützte den Oberkörper auf die Hand auf, der Kopf war krampfhaft in den Nacken zurückgebeugt, das Gesicht schmerzvoll verzogen, die Augen annähernd geradeaus gerichtet, er strampelte mit den Beinen und klagte über Frostgefühl dafelbst. Dazwischen schrie er mehrfach auf und jammerte fortgesetzt über die Schmerzen in der Stirn, faßte sich auch mehrfach an den Kopf. Nach 10 Minuten äußerte er: Nun ist es vorbei. Nachher klagte er über Schmerzen und Spannungsgefühl an den Außenseiten der Oberschenkel. Er hatte täglich 3 solcher Anfälle, dann blieben sie volle acht Tage aus, setzten darauf wieder ein mit vollkommener Bewußt-

losigkeit, um mit solchen Anfällen mit freiem Sensorium in unregelmäßiger Weise abzuwechseln. Trotz Balkenstich-Operation traten im weiteren Verlaufe der Krankheit fast täglich langdauernde Krampfanfälle mit Bewußtseinsverlust und Erbrechen auf. Liegt bei Beginn des Anfalles steif auf dem Bett, das Gesicht cyanotisch bläulich. Der Kopf ist stark nach hinten über gebogen. Die Augen weit geöffnet und gradeaus gerichtet, liegt starr da, bewußtlos. Nach 30 Sekunden dauernder tonischer Spannung leichte, ca $1\frac{1}{2}$ Minuten dauernde klonische Zuckungen. Nach den Anfällen Erbrechen und Schlaf von einer Stunde. Patient wurde immer benommener im weiteren Verlaufe der Behandlung, die Anfälle häufen sich immer mehr, sodaß 6 Wochen nach der Operation infolge Atemlähmung der Exitus letalis eintrat.

Leider neigen die Anfälle, wie ja auch der vorangehende Fall III zeigt, zu Progression. Die ursprüngliche Erscheinung des Petit mal gehen im Verlaufe der Erkrankung in tonische und klonische Krampfanfälle einer Muskelgruppe über und pflegen später auch andere derselben oder der anderen Seite zu befallen. Ein klassisches Beispiel für Progression zeigt:

Fall IV. V. Irmgard, $14\frac{1}{2}$ Jahre.

Anamnese: Heredität o. B. Eltern und Geschwister gesund. Mit 10 Jahren wurde Patientin in die Nervenklinik gebracht wegen täglich mehrerer Anfälle, die sich darin äußerten, daß sie plötzlich zusammenfank, den Kopf nach rechts drehte, in die Luft starrte, tief Atem holte und dann wieder zu sich kam. Außerdem legte sie ein auffallend kindisches, läppisches und ungezogenes Wesen an den Tag, störte den Schulunterricht und konnte ihm nicht folgen; ermüdete leicht,

Während der Behandlung von 1 Jahre besserte sich der Zustand der Patientin, sodaß sie entlassen wurde. Mit 14 Jahren änderten sich die Anfälle, die nie ganz aufgehört hatten, sie stößt ruckartig beide Arme von sich, ist dabei aber bewußtlos. Die Anfälle dauern ca. 20 Sekunden, in letzter Zeit länger, und kommen täglich, auch nachts mehrere Male vor.

stat. som: Auffallendes, gut entwickeltes Mädchen menses mit 11 Jahren. Sensibilität, Motilität und Reflexerregbarkeit o. B. keine größeren Augen und Sehstörungen nachweisbar. Sonstiger körperlicher Befund o. B.

stat. psych: In der geistigen Entwicklung etwas zurückgebliebenes Mädchen, muß zur Arbeit gezwungen werden, ermüdet schnell bei Anstellung von Intelligenzprüfungen. Auffallend läppisch=zutrauliches Wesen. Größere Intelligenz- und Kenntnisstörungen sind jetzt nicht nachweisbar.

klin. Diag.: Hypophysentumor. Im Verlaufe der Behandlung kam ein Anfall zur Beobachtung, bei dem die Patientin mit krampfhaft gebeugten Armen und Beinen, mit zur Seite gebogenem Kopf und halb geöffneten Augenlidern stöhnend im Bette lag. Der Anfall dauerte ca. 30 Sekunden. Nach einem Monat Behandlung wurde Patientin von den Eltern nach Hause abgeholt.

Haben die Krämpfe im Gesicht oder Finger und Armen begonnen, so gehen sie sehr bald auf die Beine über und nehmen dann an Dauer oft erheblich zu. Oft genug wandern die Krämpfe über den Kopf nach der anderen Körperhälfte hinüber, dabei geht gleichzeitig in der Regel das Bewußtsein verloren. Jedoch erleidet fast stets der Krampfanfall in dem Gebiet, in

dem er begonnen hat. Die Kranke fühlt sich nach einem Anfall außerordentlich matt und abgespannt und fällt in tiefen Schlaf; Zungenbiß wird selten, desto häufiger unfreiwilliger Abgang von Kot und Urin während des epileptiformen Anfalles beobachtet.

Als Krämpfe erregendes Moment könnte eine Intoxikation, hervorgerufen durch die Funktionsanomalie der wie eingangs erwähnt, durch Tumoren in ihrer Sekretion geschädigten Hypophyse angesehen werden. Jedoch ist das nicht bewiesen; denn in sehr vielen Fällen von Dys-, Hyper- und Hypopituitarismus infolge Hypophysengeschwülsten, die durch Akromegalie, dystrophia adiposo-genitalis oder nur den Augensymptomen und psychischen Veränderungen gekennzeichnet sind, fehlen jegliche Krampfanfälle mit samt ihren Äquivalenten. Fernerhin haben experimentelle Versuche Aschners mit Hypophylin gezeigt, daß das Nervensystem gegen Schwankungen in der Sekretion der Hypophyse sehr tolerant ist. Pfeiffer und andere lehnen ebenfalls eine Schädigung des Nervensystems infolge Sekretionsanomalien der Hypophyse ab. Selbst Hypophysenexstirpation wurde experimentell ohne sichtbare Alteration des Nervensystems vertragen. Daß die Geschwulst als solche Krampfanfälle auslösen kann, wird von allen Autoren verneint.

Pfeiffer, Bruns u. a. fassen die Krampfanfälle als Nachbarschafts- und Fernsymptome auf.

Die Neubildung verdrängt Hirnsubstanz und führt zur Reizung derselben oder zur Ausschaltung der mit der Läsionsstelle in funktioneller Verbindung stehender Neuronenverbände im Sinne Monakoff's. Später kommt es zu Entzündungsvorgängen und zu entzündlichen Hirnödemen, die Umgebung der Geschwulst kann

erweichen infolge lokaler Anämie durch Kompression der benachbarten Gefäße und damit zur Nekrobiose führen. Wächst der Tumor hauptsächlich nach der vorderen Schädelgrube zu, so werden die hinteren Stirnwindungen und -bahnen gereizt und es kann zu Krampfanfällen in den Muskeln kommen, die Kopf und Augen zur Seite drehen, gleichzeitig würden sich bei dieser Lage der Geschwulst die psychischen Störungen erklären lassen. Krämpfe tonischer und klonischer Art in den Extremitäten und Rumpf sind als Reizungserscheinungen infolge direkt auf die motorische Rindenregion und ihrer Bahnen des über die Sella turcica nach oben und seitlich herausgewachsenen Hypophysentumors aufzufassen, seitlich besonders, wenn einseitige Krämpfe mit Geruchstörungen, Hyper- und Parästhesien von Seiten des Trigeminus, Reizungs- und Lähmungsercheinungen des Okulomotorius seltener des Abduzens bestehen. Druck des Hypophysentumors in Richtung auf die hintere Schädelgrube läßt den Schwindel und Erbrechen erklären. Von viel größerer Bedeutung ist aber die Tatsache, daß Geschwülste der Hypophyse, wie alle Neubildungen des Schädels, eine Druckwirkung auf das Gehirn hervorrufen. Da beim Erwachsenen die Schädelkapsel starr und unnachgiebig ist, so muß die Druckwirkung der Geschwulst zur Druckerhöhung im Schädelinnern führen. Bis zu einem gewissen Grade kann die Verdrängung und Resorption des liquor cerebrospinalis dem entgegenwirken, bei Kindern kommt es außerdem zum Auseinanderweichen der Nähte. Diese Grenze wird aber bald überschritten, besonders, da die Tumoren fast immer mit einer Vermehrung des liquor cerebrospinalis, dem Hydrocephalus internus einhergehen. Die Hirndruckercheinungen zei-

gen sich, worauf Wernecke u. A. besonders hingewiesen haben, in Spannung der Dura, Druckfuren am Schädel, die bis zur völligen Ufurierung und Hirnprolaps führen können und Erhöhung des Druckes des liquor cerebrospinalis. Dieser Hydrocephalus internus vermehrt also die Raumbeengung, die der Tumor an sich schon hervorruft und führt zu einer Stauung im Lymphkreislauf mit Erweiterung des perivaskulären und perizellulären Lymphräume. Die Hirnrinde wird also in vielfacher Weise geschädigt, einmal durch diese Lymphstauung, ferner leidet die Ernährung der Hirnrinde durch die Behinderung des venösen Abflusses und Störung des arteriellen Zuflusses Not, außerdem wird die Hirnrinde durch den reinmechanischen Vorgang des Druckes des Hypophysentumors, dem die Hirnrinde gegen die unnachgiebige Schädelkapsel aufgesetzt ist, geschädigt. Dieser Hydrocephalus internus kann sich auf dem III. Ventrikel beschränken, wird aber meist so hochgradig, daß sich lediglich durch den erhöhten Hirndruck die allgemeinen epileptiformen Konvulsionen als Reizungserrscheinungen der motorischen Rindenregion des Gebiets der Centralwindungen und ihrer Hirnbahnen ebenso wie die psychischen Veränderungen erklären lassen. Es zeigt sich ja auch, daß oft nach den hirndruckentlastenden Schädeloperationen die Krampfanfälle zurückzugehen pflegen und das Sensorium freier wird.

Zum Schluß ist es mir eine angenehme Pflicht, meinem verehrten Lehrer, Herrn Geh. Medizinalrat Prof. Dr. med. Anton, meinen Dank auszusprechen für die Ueberlassung des Materials und für die wohlwollende Unterstützung meiner Arbeit.

Literaturverzeichnis.

1. Archiv für Psychiatrie.

Band 47. a) Hayaski, anatomische Untersuchung eines Falles von Hypophysentumor.

b) Goldstein, meningitis sacra unter dem Bilde hypophysärer Erkrankung.

c) Pfeiffer, Psychische Störungen bei Hirntumoren.

Band 48. Witt, Ein Beitrag zur Symptomatologie und pathologischen Anatomie der Akromegalie.

Band 58. Kankleit, Zur Symptomatologie von Tumoren der Hypophysengegend.

2. Handbuch der Neurologie (Lewandowski).

Band III. Redlich, Hirntumor.

Band IV. a) Schüller, Dystrophia adiposo-genitalis.

b) André Levi, Acromegalie.

3. Neurologisches Zentralblatt.

Band 31 Nr. 14. Bd. 32 Nr. 12 Bd. 33 Nr. 19, 20,
21. Bd. 34 Nr. 21. Bd. 35 Nr. 11. Bd. 36 Nr. 14.

4. Zeitschrift für Nervenheilkunde.

Band 51. Eickelberg, Zur Diagnostik und Therapie der Gehirntumoren.

Band 55. Meggendorfer, Ueber Vortäuschung verschiedener Nervenkrankheiten durch Hypophysentumoren.

5. Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie.

Band 44. Mayer, Über hypophysäre und epiphysäre Störungen bei Hydrocephalus internus.

6. Monatsschrift für Neurologie und Psychiatrie.

Band 33. Peritz, Hypophysenerkrankungen.

Band 37. Meyer, Ein Fall von Akromegalie mit Hypophysencyste.

7. Jahresbericht der Neurologie und Psychiatrie.

a) Referate von Maas, morbus Basedowi, Mixödem, Akromegalie und Hypophysenerkrankungen.

b) Bruns, Geschwülste und Parasiten des Gehirns im Band 15 - 20.

8. Zeitschrift für Psychiatrie.

Band 65. Zöllner, Über einen Fall von Hypophysentumor.

Band 69. Westphal, Ein Fall von beginnender Akromegalie mit deutlichem Röntgenbefund in der sella turcica.

Lebenslauf.

Am 15. Oktober 1891 wurde ich, Kurt, Bruno Sauerbrey in Breslau geboren als Sohn des Ing. Br. Sauerbrey. Ich besuchte das Kgl. Stiftsgymnasium zu Zeitz, das ich 1911 mit dem Reifezeugnis verließ. Sommersemester 1911 diente ich als Einjährig-Freiwilliger beim 5. Bad. Inf. Regt. Nr. 113 in Freyburg i./B. und studierte daselbst Medizin bis S. S. 1912, W. S. 1912/13 und S. S. 1913 studierte ich in Leipzig und bestand dort am 29. Juli die ärztliche Vorprüfung, darauf war ich noch ein Semester in Freyburg und ein Semester in Greifswald. Am 3. Mobilmachungstage wurde ich als Feldunterarzt eingezogen. Am 1. November 1918 vom Heere zur Fortsetzung meiner Studien nach Halle beurlaubt, bestand ich daselbst am 11. Juli die ärztliche Prüfung. Am 16. Juli 1919 wurde mir unter Anrechnung des Kriegsdienstes auf das praktische Jahr die Approbation erteilt. Die Promotion fand am 9. Oktober 1919 statt.

Während meines Studiums besuchte ich die Vorlesungen, Kliniken und Kurse folgender Herren Professoren und Dozenten in Freyburg i. Br.: Oltmanns, Gaupp, Wiedersheim, Himstedt, Gattermann, Schleip, v. Gries, Keibel, Doflein, Aschoff, Kraske, Straub, de la Camp, Bacmeister, Hildebrand, Ritschl, Bulius.

In Leipzig:

Hering, Chun, Hantsch, Rabl, Wiener, Kästner-Lilienfeld.

Spalteholz, Paal, Dittler, Sieglbauer, Siegfried, v. Brücke.

In Greifswald:

Morawitz, Pels Leusden, Groß, Peiper, Krömer, Beumer, Römer.

In Halle:

Anton, Schmieden, Volhard, Benecke, Denker, Schieck
Sellheim, Schmidt, Grouven, Groß, Mohr, Stoelzner,
Eisler, Lindemann.



